4 Rotationszentren & Diagnostik

Screening Kiefergelenk

Reha - Med
PRAXIS FÜR KRANKENGYMNASTIK UND SPORT - REHA

1.Laterotrusionsläsion - Rotationskette	Aussage
Rotation des Kopfes im Stand und im Sitz	Bei primärer CMD dreht der Patient den Kopf schlecht zur hohen Seite. Dies verbessert sich nicht im Sitz.
Rotation der Brustwirbelsäule	Deutlicher Bewegungsverlust zu einer Seite, der sich im Sitzen nicht verbessert.
Derbolowski Test ohne Biss mit Biss	Störung der Lenden- Becken - Hüft-Mechanik, wenn ein Bein länger wird. CMD verstärkt/ löst „Beinverlängerung“aus.
Patrick Kubis Test	Die Hüftabduktion ist als Zeichen der gestörten Beckenmechanik bei einer Kiefer- Laterotrusion links auf der rechten Seite zwingend deutlich reduziert. Dies verbessert sich deutlich durch Bissausgleich.
Hüftinnenrotation	Deutlich reduziert (siehe Hüftabduktion)
Einbeinstand	Das Knie dreht auf der Seite der gestörten Hüftmechanik beim Versuch auf einem Bein zu Stehen deutlich nach innen. Deutliche Stabilisierung nach Bissausgleich.
2.Verlust an Bisshöhe	
Kopfrückneige und beidseitige Kopfdrehung	Bisshöhenverlust führt zur „Kopfvorhalte“ und somit zu reduzierter Dreh- und Kopfrückneige-fähigkeit.
Lendenbeugetest im Stand	Kompensatorisch verstärkt sich die Lenden-lordose mit reduzierter Beugefähigkeit.
„Kinn zur Brust“	Reduzierte Beweglichkeit bei „dickem Hals“ cave - verträgt der Patient Höhe ?!?

Alle Parameter verbessern sich durch Bissausgleich!!!!!

Screening Kiefergelenk

Reha - Med
PRAXIS FÜR KRANKENGYMNASTIK UND SPORT - REHA

Laterotrusionsläsion - Rotationskette			Ankreuzen
Rotation des Kopfes im Stand	rechts		links
im Sitz verbessert	ja		nein
Rotation der Brustwirbelsäule	rechts		links
im Sitz verbessert	ja		nein
Derbolowski Test ohne Biss	rechts lang cm	links lang cm	gleich
mit Biss	rechts lang cm	links lang cm	gleich
Patrick Kubis Test	reduziert rechts	reduziert links	gleich
Hüftinnenrotation	reduziert rechts	reduziert links	gleich
Einbeinstand	instabil rechts	instabil links	gleich

Verlust an Bisshöhe

Kopfrückneige reduziert	ja	nein
Verbesserug durch Bissausgleich	ja	nein
beidseitige Kopfdrehung reduziert	ja	nein
Verbesserung durch BA	ja	nein
„Kinn zur Brust“ reduziert	ja	nein
Verbesserung durch BA	ja	nein
Lendenbeugetest im Stand reduziert	ja	nein
Verbesserung durch BA	ja	nein